

הדרכה לביצוע תבחין נשיפה להליקובקטר פילור c13

1. יש להגיע לבדיקה עם טופס הפניה של חפא.
 2. יש להפסיק טיפול אנטיביוטי ו/או תרופות המפחיתות חומצת קיבה (כמו גסטרו, זנטב, טגמט, לוסק, זוטון, קונטרולוק, אומפרדקס וכו') לפחות 7 ימים לפני הבדיקה.
 3. אם את או אתה מקבלים תכשיר אחר לטיפול בצרבת, נא התייעצו על כך עם רופא המשפחה שלכם לגבי הפסקת הטיפול.
 4. אם הוזמנת לבדיקה חוזרת לאחר שהשלמת טיפול אנטיביוטי לחיסול החיידק, יש להמתין לפחות 30 יום מסיום הטיפול האנטיביוטי.
 5. יש להיות בצום של 8 שעות, לפחות לפני הבדיקה (וחשוב להימנע גם משתייה של מים).
 6. אין לעשן לפחות 8 שעות לפני הבדיקה.
 7. יש להצטייד במיץ תפוזים טבעי (לא מוגז). אין לשתות אותו לפני הבדיקה.
 8. הבדיקה אסורה לנשים בהריון.
 9. משך הבדיקה כחצי שעה – נא לדייק בהגעה לבדיקה.
 10. אנחנו נשלח את התשובה לרופא המפנה תוך 7-10 ימים.
 11. בכל שאלה ניתן לפנות למרפאה: 09-7940400.
- לידיעתך: אין תופעות לוואי מיוחדות לאחר הבדיקה.

בברכה,

צוות מרפאה יועצת

בן גוריון 43, כפר סבא