

Co-Amilozide أقراص 2,5 ملغ / 25 ملغ و 5 ملغ / 50 ملغ

هيدروكلوريد الأميلوريد وهيدروكلوروثيازيد

1. ما هي أقراص Co-Amilozide وما هي دواعي استخدامها

اسم دواءك هو Co-Amilozide أقراص. يحتوي هذا الدواء على اثنان من المكونات النشطة، هيدروكلوريد الأميلوريد وهيدروكلوروثيازيد. يزيل هيدروكلوريد الأميلوريد الماء الزائد ويمنع حدوث انخفاض في مستويات البوتاسيوم. يزيل هيدروكلوروثيازيد الماء الزائد من الجسم.

يتم طرح أقراص Co-Amilozide بتركيزين وهي تستخدم في علاج قصور القلب، ضغط الدم المرتفع، احتباس السوائل الناتج عن مرض الكبد (خاصة عندما يكون هناك أهمية خاصة للحفاظ على مستويات البوتاسيوم).

2. قبل أن تأخذ أقراص Co-Amilozide

يجب أن تمتنع عن تناول أقراص Co-Amilozide إذا كنت:

- تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) تجاه هيدروكلوريد الأميلوريد أو هيدروكلوروثيازيد أو أي من المكونات الأخرى في أقراص Co-Amilozide (انظر القسم 6)
- تعاني من الحساسية تجاه أحد المضادات الحيوية المسماة السلفانوميدات مثل سلفاميثوكسازول
- سبق أن أخبرك طبيبك بأنك تعاني من ارتفاع مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم أو اليوريا أو الكرياتينين في الدم
- لديك فشل أو مرض كلوي أو تعاني من عدم القدرة على التبول
- تعاني من فشل كلوي حاد
- تتناول مكملات البوتاسيوم أو أدوية تحتوي على البوتاسيوم أو تتناول مقادير كبيرة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
- تأخذ مدرات البول التي لا تدخر البوتاسيوم مثل سبيرونولكتون أو تريامتيرين
- تتناول الليثيوم (المستخدم لعلاج الاكتئاب الهوسي)
- تعاني من داء السكري (ارتفاع مستوى السكر في الدم)
- مصابا بمرض أديسون (مرض في الغدة الكظرية)
- كنت حاملا أو تظني أنك ربما كنت حاملا أو ترضعين من الثدي
- كنت أصغر من 18 عام

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ أقراص Co-Amilozide إذا كنت:

- مسنا أو تعاني من مرض شديد
- عانيت مؤخرا من قيء أو إسهال حاد
- تعاني من تليف الكبد ومن مستويات عالية بشكل غير طبيعي من القلوية في الجسم (قلاء استقلابي)
- أو سبق أن عانيت من وجود مستويات عالية من الحمض في الجسم (الحمض الأيضي أو التنفسي) ناتجة عن مرض في القلب أو مرض السكري الذي تم التحكم فيه بشكل سيئ.
- تعاني من احتباس البول الأمر الذي يسبب حدوث تورم (وذمة مقاومة)
- مرض حاد في الكبد
- اختلال وظائف القلب
- تتناول أحد أدوية الديجيتال مثل الديجوكسين – يتم استخدامها لعلاج فشل القلب وضربات القلب غير الطبيعية
- تعاني من مرض النقرس (حالة يؤدي زيادة حمض اليوريك في الجسم إلى حدوث آلام في المفاصل)
- من المقرر إخضاعك لاختبار حمل الجلوكوز (يجب إيقاف هذا الدواء لمدة ثلاثة أيام على الأقل).
- سبق أن أخبرك طبيبك بأنك تعاني من ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية (نوع من الكوليسترول) في دمك
- تعاني من الربو الشديد
- تعاني من الذئبة الحمامية الجهازية (مرض يهاجم فيه الجهاز المناعي أنسجة الجسم)

- سبق لك الإصابة بسرطان الجلد أو إذا عانيت من آفة جلدية غير متوقعة أثناء العلاج. قد يؤدي العلاج باستخدام هيدروكلوروثيازيد، وبشكل خاص عند الاستخدام طويل الأمد بجرعات عالية، إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد والشفاه (سرطان الجلد غير القتامي). يجب أن توفر الحماية لبشرتك من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية أثناء تناول أقراص Co-Amilozide.

تناول الأدوية الأخرى

أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أو أخذت مؤخرًا، أي أدوية أخرى، بما فيها تلك التي تم الحصول عليها دون وصفه طبية.

الأدوية التالية يمكن ان تؤثر أو تتأثر عند المعالجة باستخدام أقراص Co-Amilozide:

- الأدوية المستخدمة لعلاج سرطان الكلى مثل الديسلوكين
- الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ((NSAIDs، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين – تستخدم لتخفيض درجة الحرارة المرتفعة (الحمى) أو الألم أو التهاب المفاصل
- المسكنات مثل الكودايين، ديهيدروكودين، ديكستروبروبوكسيفين، ديامورفين، المورفين، بنتازوسين، بينيديين
- راتنجات التبادل الأنيوني المستخدمة لتخفيض الكوليسترول (مثل كولسترامين، كوليستيبول) – يجب إعطاء هذه الأدوية بفارق ساعتين على الأقل
- الأدوية المضادة لاضطراب النظم المستخدمة لعلاج عدم الانتظام الغير عادي في ضربات القلب (مثل كينيدين أو بروكيناميد)
- الأدوية المستخدمة لعلاج الإنتانات البكتيرية مثل تريميثوبريم
- الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب (على سبيل المثال، ريبوكستين، العقاقير ثلاثية الحلقات، مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين)
- أدوية علاج مرض السكري (مثل كلوربروباميد)
- كاربامازيبين لعلاج الصرع
- امفوتريسين وفوريكونازول، تستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية
- الوبورينول، يستخدم لتجنب الإصابة بالنقرس
- الأدوية المضادة للهستامين المستخدمة لعلاج الحساسيات، على سبيل المثال إستيميزول وتيرفينادين
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) مثل إنالابريل المستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع أو مشاكل القلب
- مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين من الفئة الثانية مثل لوسارتان – تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع أو لعلاج مرضى السكري الذين يعانون من تلف الكلى
- أي أدوية أخرى تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مثل أتينولول أو فيراباميل أو أملوديبيين
- الأدوية المستخدمة لعلاج الملاريا مثل هالوفانترين
- الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض النفسية (على سبيل المثال بريموزيد وسيرتيندول)
- مكملات البوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات.
- أدوية الجلوكوسيدات القلبية المستخدمة في حالات قصور القلب (مثل ديجوكسين)
- المنشطات (مثل الكورتيزون والهيدروكورتيزون)
- مدرات البول مثل سبيرونولاكتون أو تريامتيرين أو أسيتازولاميد.
- الأدوية المستخدمة لعلاج مرض باركنسون (مثل أمانتادين، ليفودوبا)
- الهرمونات أو العقاقير التي تعمل على الهرمونات (مثل تريلوستان، توريميغين، الإستروجينات)
- الأدوية المستخدمة لقمع الجهاز المناعي بعد زرع الأعضاء (مثل سيكلوسبورين وتاكروليماس)
- الليثيوم – يستخدم لعلاج الاكتئاب
- البريبوتورات المستخدمة في التهدئة وكمواد للتخدير
- مرخيات العضلات "غير المزيلة للاستقطاب" مثل التوبوكورارين المستخدم في الجراحة.
- أخبر طبيبك إذا كنت ستدخل المستشفى للخضوع لعملية جراحية
- النترات لعلاج الذبحة الصدرية
- كاربينوكسولون، يستخدم لعلاج قرحة المعدة

أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، أو أخذت مؤخرًا، أي أدوية أخرى، بما فيها تلك التي تم الحصول عليها دون وصفه طبية.

أخذ أقراص Co-Amilozide مع الطعام والشراب

إذا كنت تشعر بدوخة عند تناول هذا الدواء فإن الكحوليات قد تزيد هذا الأمر سوءا.

الحمل

يجب ان تخبري طبيبك إذا كنتِ حاملا أو كنتِ تعتقدين أنكِ حامل. عادة، سينصحك طبيبك بتناول دواء آخر بدلا من Co-Amilozide، حيث أن تناول Co-Amilozide لا ينصح به أثناء فترة الحمل. وذلك لأن Co-Amilozide يعبر المشيمة، ولأن استخدامه بعد الشهر الثالث من الحمل قد يسبب حدوث آثار ضارة على الجنين وحيثي الولادة.

الرضاعة الطبيعية

أخبري طبيبك إذا كنتِ ترضعين رضاعة الطبيعية أو على وشك البدء في الإرضاع طبيعيا. لا ينصح بإعطاء Co-Amilozide للأمهات اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية. من فضلك اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على النصيحة قبل أخذ أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

قد ينتج عن تناول هذا الدواء الشعور بالدوار أو تقليل الانتباه أو إضعاف الرؤية. لا تمارس القيادة أو تشغيل الآلات في حال تأثرك بعد تناوله.

معلومات هامة عن بعض مكونات أقراص Co-Amilozide

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز، إذا كان طبيبك قد سبق أن أخبرك أن لديك حساسية مفرطة تجاه بعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل أخذ هذا الدواء.

3. كيفية أخذ أقراص Co-Amilozide:

تناول أقراص Co-Amilozide دائما بنفس الطريقة التي أخبرك بها طبيبك. سيتولى طبيبك اختيار الجرعة الصحيحة التي تناسبك. وسيتولى الصيدلي تدوين هذه الجرعة على الملصق. ينبغي أن يتم تناول أقراص هذا الدواء كاملة. جرعة البدء المعتادة هي:

معالجة ارتفاع ضغط الدم:

- قرص واحد مرة واحدة يوميا. قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة، وقد تصل إلى قرصان في اليوم.

معالجة قصور القلب:

- قرص واحد مرة واحدة يوميا. قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة، وقد تصل إلى أربعة أقراص في اليوم.

معالجة احتباس البول عند مرض الكبد:

- اثنان قرص يؤخذان مرة واحدة يوميا. قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة، وقد تصل إلى أربعة أقراص في اليوم.

قد يرغب طبيبك في مراقبة مستويات الأملاح لديك مع إخضاعك لاختبارات الدم بشكل منتظم، وخاصة إذا كنت من المسنين أو لست بحالة جيدة، بغية التحقق من عدم وجود أي عدم اختلال محتمل في التوازن.

الأطفال

- لا ينصح باستخدام هذا الدواء في علاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

إذا أخذت أقراص Co-Amilozide بجرعة أكثر مما يجب

إذا حدث أنك (أنت أو أي شخص آخر، بما في ذلك طفل)، تناولت أقراص Co-Amilozide بمقدار أكثر مما يجب، يجب عليك الاتصال بقسم الطوارئ في أقرب مستشفى أو بالطبيب على الفور. احرص دائما على أن تأخذ عبوة الدواء وهذه النشرة معك.

إذا نسيت أن تتناول أقراص Co-Amilozide

إذا نسيت أن تتناول جرعة، قم بأخذها حالما تتذكر. إذا كان الوقت قريبا من موعد جرعتك القادمة، لا تتناول الجرعة المنسية أبدا. لا تقم أبدا بأخذ جرعة مزدوجة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، أقراص Co-Amilozide يمكن أن تسبب حدوث بعض الآثار الجانبية على الرغم من أنها لا تصيب الجميع. مثلما يحدث مع جميع الأدوية، قد يظهر رد فعل تحسسي لدى عدد قليل من الناس.

إذا واجهت أيًا مما يلي، توقف عن تناول أقراص Co-Amilozide وتوجه لزيارة الطبيب على الفور:

- ردود فعل سلبية خطيرة – قد يكون من بين العلامات التهاب الأوعية الدموية، صعوبات في التنفس أو البلع، حدوث هبوط أو احمرار أو بثور أو تقشير الجلد، آلام في العضلات، قشعريرة، الشعور العام بالتوعك، تقرحات في الفم أو العينين أو الأعضاء التناسلية.

الأعراض الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها:

- تغير في توازن للسوائل أو المواد الكيميائية في الجسم (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والمغنيسيوم)، الأمر الذي قد يسبب الشعور بالتوعك أو الغثيان، الضعف، التعب، التهيج، الأرق، الارتباك، تشنجات العضلات.
- الدم: تغير في عدد وأنماط خلايا الدم الأمر الذي يسبب زيادة في حدوث الكدمات، النزيف في الأنف، التهاب الحلق، العدوى، الإرهاق المفرط، عسر التنفس عند بذل الجهد أو شحوب الجلد بشكل غير طبيعي (قد تكون بحاجة للخضوع إلى فحص دم).
- الاستقلاب: جفاف، تغيرات في الشهية، نقرس، تغيرات في مستويات المواد الكيميائية في الجسم (زيادة البوتاسيوم أو الجلوكوز أو حمض اليوريك في الدم أو انخفاض الصوديوم في الدم)، وجود جلوكوز في البول.
- الجهاز العصبي: صعوبة في النوم، نعاس، ارتباك، انخفاض الاستجابة للتحفيز (ذهول)، فقدان الوعي، العصبية، الاكتئاب، صداع، دوخة (الدوار)، وخز وشكشكة، رجفة، التملل، مرض المخ (يتميز بفقدان الوظيفة، القدرة على التركيز، تغييرات خفية في الشخصية).
- الحواس: تغيرات في الرؤية مثل رؤية مشوشة أو مائلة إلى الاصفرار، مذاق سيء، طنين في الأذن (الطنين)، زيادة الضغط في العين.
- القلب: ألم في الصدر (ذبحة صدرية)، عدم انتظام (اضطراب النظم)، سريع (تسارع ضربات القلب) أو ثقل (خفقان) دقات القلب، دوخة عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم، التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الناجز)،
- الجلد: طفح جلدي، نتوءات مرتفعة غير منتظمة مع حكة شديدة (بثور)، تعرق مفرط، فقدان الشعر، احمرار البشرة، حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي (مثل أسرة الشمس)، كدمات وتغيير في لون الجلد (فرقية). الوتيرة "غير معلومة": سرطان الجلد والشفاه (سرطان الجلد غير القمامي).
- التنفس: صعوبة في التنفس، فواق، احتقان الأنف، سعال، سائل في الرئتين والتهاب الرئة (التهاب رئوي).
- المعدة والأمعاء: الشعور بالاعتلال أو الغثيان، إسهال، إمساك، آلام في البطن وشعور بالامتلاء، إطلاق ريح، تنشيط قرح المعدة، تشنجات في المعدة، نزيف دموي في المعدة، التهاب في الغدد اللعابية، جفاف الفم
- الكبد والبنكرياس: التهاب في البنكرياس (التهاب البنكرياس)، تغيرات في وظائف الكبد، يرقان (اصفرار في الجلد أو العينين).
- العضلات والمفاصل: تشنجات العضلات، آلام في الساق، آلام في الظهر، ألم في المفاصل، آلام في الرقبة والكتف.
- المسالك البولية والتناسلية: الاستيقاظ في الليل للتبول، ألم عند التبول، زيادة أو انخفاض في مقدار البول، عدم القدرة على التحكم في حركات المثانة، ألم في المثانة، ضعف وظائف الكلى، فشل أو التهاب في الكلى، عدم القدرة على تحقيق أو المحافظة على الانتصاب، انخفاض الاهتمام بالجنس.
- أخرى: ألم في الصدر، إجهاد، الشعور بالتوعك، ضعف، عطش، حمى.

5. كيفية تخزين أقراص Co-Amilozide

يحفظ بعيدا عن أنظار وعن متناول الأطفال

- لا تخزن الدواء في درجة حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، التخزين يكون في العبوة الأصلية ولا يجب نقل الأقراص إلى عبوة أخرى.
- لا تأخذ الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على الملصق؛ تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ينبغي ألا يتم التخلص من الأدوية عبر سكبها في مياه الصرف أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. هذه التدابير سوف تساعد على حماية البيئة.

6. المزيد من المعلومات

ما هي محتويات أقراص Co-Amilozide

المكونات النشطة هي: هيدروكلوريد الأميلوريد (2,5 ملغ أو 5 ملغ) وهيدروكلوريد الأميلوريد (25 ملغ أو 50 ملغ).

المكونات الأخرى هي: لاکتوز، فوسفات الكالسيوم ثنائي القاعدة، نشا الذرة، نشا الذرة المحول مسبقا إلى هلام، ستيرات المغنيسيوم، ماء مقطر.

ما هو شكل أقراص Co-Amilozide وما هي محتويات العبوة

أقراص Co-Amilozide هي أقراص ذات لون أصفر باهت محفوظة في عبوات شرائط غير شفافة أو في حاويات بلاستيكية من البولي إيثيلين

المستورد: نوفولوج، شارع همعيان 55، المنطقة الصناعية موديعين، اسرائيل