

نشرة الحزمة: معلومات المستخدم

**أقراص نوربرولاك NORPROLAC 75 ميكروغرام
كيونوجوليde Quinagolide**

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.

إذا كنت تعاني من انخفاض مؤقت في ضغط الدم مع صداع طفيف يرتفع بسرعة ، مما قد يؤدي ، في حالات نادرة ، إلى الإغماء ، فمن المستحسن أن يقوم طبيبك بفحص ضغط الدم في بداية العلاج وعند زيادة الجرعة. سيكون التحكم في ضغط الدم أكثر صلة في حالة أمراض القلب الشديدة.

إذا كان لديك مشاكل في الخصوبة تتعلق بالبرولاكتين لأن العلاج بـ Norprolac نوربرولاك يمكن أن يعيض الخصوبة. لم تكنني تريدين أن تصبحي حاملاً ، يجب عليك استخدام طريقة من الحمل (انظر قسم "الخصوبة والحمل والرضاعة".)

إذا كان لديك أي من الأمراض التالية: عانيت أو تعاني من اضطرابات نفسية أو مشاكل في الكبد أو الكلى.

أخبر طبيبك إذا لاحظت أنت أو أسرتك / مقدمو الرعاية أنك تطور الرغبة أو الرغبة الشديدة وتتصرف بطريقة غير معتادة بالنسبة لك ولا يمكنك مقاومة الرغبة أو التعامل أو الإغراء لأداء أنشطة معينة قد تكون ضارة لك أو الآخرين. تسمى هذه اضطرابات التحكم في الاندفاع ويمكن أن تشمل سلوكيات مثل المقامرة الإدمانية أو الإفراط في تناول الطعام أو الإنفاق أو الرغبة الجنسية العالية بشكل غير طبيعي أو زيادة في الأفكار أو المشاعر الجنسية. يجب على طبيبك تقليل أو إيقاف الجرعة.

نوربرولاك مع أدوية أخرى
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

يجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:

- مضادات الذهان لأنها قد تقلل من التأثير على الحد من نوربرولاك برولاكتين.
- مضادات الاكتئاب أو الأدوية لعلاج مرض باركنسون والصداع النصفي الحاد ، إلخ.
- الأدوية المعروفة بأنها تمنع بشكل فعال الإنزيمات المشاركة في انهيار الأدوية
- مضادات الهيستامين.

نوربرولاك مع الطعام والشراب والكحول
يجب ألا تشرب الكحول أثناء تناولك Norprolac ، لأن الأعراض الجانبية قد تزداد.

الخصوبة والحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً أو توينين الحمل ، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.
 الخبرة أثناء الحمل محدودة. إذا أصبحت حاملاً أو ترغب في الحمل أثناء تناول نوربرولاك ، أخبر طبيبك.

يسبب نوربرولاك Norprolac انقطاع إفراز الحليب ، وبالتالي لا يمكن الرضاعة الطبيعية. ومع ذلك ، لا ينبغي استمرار الرضاعة الطبيعية على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية ممكنة لأنه من غير المعروف ما إذا كان Quinagolide كيونوجوليديم في حليب الثدي.

القيادة واستخدام الآلات

في بعض الأشخاص ، قد يقلل Norprolac من الاستجابة خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند الحاجة إلى حالة تثبيه ، مثل القيادة أو أداء العمل الدقيق.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسلطة ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك وحدك ولا يجب أن تنقله للآخرين ، حتى لو كان لديهم نفس أعراض المرض التي لديك ، لأنها قد تضر بهم.
- إذا واجهت أي آثار جانبية ، استشر طبيبك ، حتى لو كانت هذه الآثار الجانبية غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

محتويات الحزمة:

1. ما هي أقراص 75 Norprolac نوربرولاك ميكروغرام وما هي الأعراض؟
 2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول أقراص 75 Norprolac نوربرولاك ميكروغرام؟
 3. كيف تأخذ أقراص نوربرولاك 75 Norprolac ميكروجرام؟
 4. الآثار الجانبية المحتملة
 5. كيفية تخزين أقراص 75 Norprolac نوربرولاك ميكروغرام؟
 6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية
1. ما هي أقراص 75 Norprolac نوربرولاك ميكروغرام وما هي الأعراض؟
Norprolac هو دواء يمنع التأثير والآثار التي ينتجها هرمون يسمى البرولاكتين.

يحاول Norprolac تجنب اضطرابات الناجمة عن الإفراط في إنتاج هذا الهرمون (فرط برولاكتين الدم) ، إما بسبب وجود ورم في الغدة النخامية (ورم برولاكتيني) أو لأسباب أخرى.
يمكن أن يساعد Norprolac في تقليل حجم أو نمو الورم البرولاكتيني.
يمكن لطبيبك أن يشرح بمزيد من التفصيل ما هو نوربرولاك Norprolac المشار إليه.

2. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول أقراص 75 Norprolac نوربرولاك ميكروغرام من المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مرض.
لا تتناول Norprolac إذا كان لديك حساسية (شديدة الحساسية) من Quinagolide أو أي من مكونات Norprolac الأخرى (المدرجة في القسم 6).
- إذا كان لديك حساسية (شديدة الحساسية) من Quinagolide أو أي من مكونات Norprolac الأخرى (المدرجة في القسم 6).
- إذا كان لديك مشاكل حادة في الكبد أو الكلى.

التحذيرات والإحتياطات

تحذير إلى طبيبك أو الصيدلي قبل البدء في تناول Norprolac.
انتبه بشكل خاص مع Norprolac نوربرولاك

إذا توقفت عن تناول نوربرولاك
أخبر طبيبك إذا كنت ترغب في التوقف عن العلاج مع Norprolac
نوربرولاك. إذا توقفت عن تناول نوربرولاك ، فمن المحتمل أن يزيد مستوى هرمون البرولاكتين الخاص بك ومن المرجح أن تعود الأعراض.
ومع ذلك ، نظراً لأن هذا يحدث قبل عدة أيام من اختفاء Norprolac
نوربرولاك من جسمك ، فلن يكون تأثير التوقف عن العلاج مرئياً إلا بعد بضعة أيام.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الاعراض الجانبية المحتملة
مثل جميع أدوية Norprolac ، يمكن أن يسبب آثاراً جانبية ، على الرغم من عدم معاناة الجميع منها.
الآثار الجانبية المدرجة أدناه خفيفة بشكل عام وتحتاج بشكل متكرر أكثر خلال الأيام الأولى من العلاج أو عند زيادة الجرعة ، وتختفي مع استمرارها ، وبالتالي ، لا تغير الجرعة الموصوفة دون علم طبيها.
قد تحدث الآثار الجانبية التالية مع هذا الدواء:

شائع جداً ، قد يصيب أكثر من 1 من كل 10 أشخاص

- الدوار
- صداع الرأس
- المرض
- التقيؤ
- إعياء

شائع ، قد يصيب ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص

- انخفاض مؤقت في ضغط الدم عند تبني عمودي مما يؤدي إلى الإغماء
- فقدان الشهية (فقدان الشهية).
- صعوبة النوم
- احتقان بالألف
- ألم المعدة
- إسهال الإمساك
- ضعف العضلات

نادر ، قد يصيب ما يصل إلى 1 من كل 1000 شخص

- النعاس
- ذهان حاد يختفي عند التوقف عن العلاج مع نوربرولاك

اعراض جانبية أخرى لا يعرف عنها التردد

- خشيان

◦ عدم القدرة على مقاومة الرغبة أو القيادة أو الإغراء في اتخاذ إجراء قد يكون خطراً عليك أو على الآخرين ،
والذي قد يشمل:
حملة قوية للمقامرة ، حتى عندما يكون لها عوائق
شخصية وعائلية خطيرة.

في حالات نادرة ، يعني بعض الأشخاص من النوم المفاجئ دون الشعور بالتعب من قبل. إذا واجهت هذا الموقف ، فلا يجب أن تقوى أو تؤدي أنشطة قد تعرضك أنت أو الآخرين لخطر الضرر الشديد (مثل استخدام الألات).

معلومات مهمة عن بعض مكونات Norprolac
يحتوي هذا الدواء على الالكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك أنه لا تتحمل بعض السكريات ، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تأخذ Norprolac أقراص نوربرولاك 75 ميكروغرام
استخدم هذا الدواء دائمًا تماماً كما أخبرك طبيبك. إذا كنت في شك ، استشر طبيبك أو الصيدلي مرة أخرى. تذكر أن تأخذ دوائهما.

البار
يجب إعطاء Norprolac مرة واحدة في اليوم فقط في وقت النوم ، مع بعض الطعام ، لتجنب ظهور آثار ضارة مثل الغثيان والقيء والدوخة. ستعتد جرعة نوربرولاك على تأثيره في خفض مستوى البرولاكتين.

الجرعة الأولية
يبدأ العلاج عادة بجرعية 25 و 50 ميكروجرام / يوم ؛ تبدأ بجرعية 25 ميكروجرام / يوم للأيام الثلاثة الأولى وتستمر بجرعية 50 ميكروجرام / يوم للأيام الثلاثة القادمة.

الجرعة اليومية
من اليوم السابع ، بعد المرحلة الأولية ، تكون الجرعة الموصى بها 75 ميكروجرام / يوم. إذا لزم الأمر ، يمكن زيادة الجرعة اليومية تدريجياً حتى تصل إلى الاستجابة الفردية المثلث. تتراوح جرعة الصيانة المعتادة بين 75 و 150 ميكروجرام / يوم. قد يحتاج بعض المرضى إلى جرعات 300 ميكروغرام / يوم أو أكثر.

تستخدم في الأطفال والراهقين
خبرة الاستعمال من قبل الأطفال والراهقين محدودة.

استخدم في المرضى المسنين
خبرة الاستعمال من قبل المرضى المسنين محدودة.

إذا كنت تأخذ Norprolac أكثر مما يجب
إذا كنت قد استخدمت Norprolac أكثر مما يجب ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي على الفور أو اتصل بخدمة معلومات علم السموم ، هاتف 047771900 (915 620 420) للإشارة إلى الدواء والكمية المستخدمة. الأعراض التي يمكن توقعها في جرعة زائدة هي الغثيان والقيء والصداع والدوار والنعاس والهلوسة وانخفاض ضغط الدم.

إذا نسيت تناول نوربرولاك
إذا نسيت تناول نوربرولاك ليوم واحد ، فتناول الدواء كالمعتاد في اليوم التالي.

لا تأخذ جرعة مضاعفة في اليوم التالي لتعويض الجرعة الغائبة ، لأنها قد تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها.