

מינית גבוהה באופן חריג או עלייה במחשבות או ברגשות המיניים. על הרופא שלך להפחית או להפסיק את המינון.

נורפרולאק NORPROLAC 75 מיקרוגרם טבליות קוינאגוליד Quinagolide

- קרא עלון זה בזהירות לפני שתחיל להשתמש בתרופה מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך.
- שמור עלון זה. יתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
- אם יש לך שאלות, שאל את הרופא או הרוקח.
- תרופה זו נרשמה עבורך ואסור להעביר אותה לאחרים, גם אם יש להם אותם תסמיני מחלה, מכיוון שהיא עלולה לפגוע בהם.
- אם אתה נתקל בתופעות לוואי, התייעץ עם הרופא שלך, גם אם תופעות לוואי אלה אינן מופיעות בעלון זה. ראו סעיף 4.

תוכן העלון:

1. מהן טבליות Norprolac 75 ולמה הן משמשות?
2. מה צריך לדעת לפני שלוקחים טבליות Norprolac 75?
3. כיצד ליטול טבליות Norprolac 75?
4. תופעות לוואי
5. כיצד לאחסן טבליות Norprolac 75?
6. תכולת החבילה ומידע נוסף

1. מהן טבליות Norprolac 75 ולמה הן משמשות?

Norprolac היא תרופה המונעת את הפעולה ואת ההשפעות המיוצרים על ידי הורמון הנקרא פרולקטין (Prolactin). נורפרולאק Norprolac מנסה למנוע הפרעות הנגרמות כתוצאה מייצור עודף של הורמון זה (היפר-פרולקטינמיה hyperprolactinemia), בין אם בגלל נוכחות של גידול בבלוטת יותרת המוח (פרולקטינומה prolactinoma) או מסיבות אחרות. Norprolac יכולה לעזור להפחית את גודל או צמיחת הפרולקטינומה (prolactinoma). היועץ ברופא שלך על מנת לקבל הסבר מפורט יותר למי מיועד Norprolac.

2. מה צריך לדעת לפני שלוקחים טבליות Norprolac 75

חשוב שתיידע את הרופא שלך אם אתה סובל ממחלה כלשהי.

אל תיקח את נורפרולאק Norprolac:

- אם אתה אלרגי לקוינאגוליד (Quinagolide) או לאחד מהמרכיבים האחרים של נורפרולאק Norprolac (המופיע בסעיף 6).
- אם יש לך בעיות קשות בכבד או בכליות.

אזהרות ואמצעי זהירות

שוחח עם הרופא או הרוקח לפני שתחיל ליטול את נורפרולאק Norprolac.

יש לטול נורפרולאק Norprolac בזהירות כאשר:

- אתם חווים ירידה זמנית בלחץ הדם בזמן כאב ראש קל המתפתח במהירות, אשר עלול, במקרים נדירים, לגרום להתעלפות. מומלץ כי הרופא יבדוק את לחץ הדם שלכם בתחילת הטיפול וכאשר תגדיל את המינון.
- שליטה זו בלחץ הדם תהיה רלוונטית יותר במקרה של מחלת לב קשה. אם יש לכם בעיות פוריות הקשורות לפרולקטין prolactin טיפול בנורפרולאק Norprolac יכול להחזיר את הפוריות. במידה ואינכם רוצים להיכנס להריון, עליכם להשתמש באמצעי מניעה (ראה פרק "פוריות, הריון והנקה").
- אם יש לך אחת מהמחלות הבאות: סבלת מהפרעות פסיכיאטריות או מבעיות בכבד או בכליה.
- ספר לרופא שלך אם אתה או משפחתך / המטפלים שלך מבחינים שאתה מפתח דחפים או חשק ומתנהג בצורה לא שגרתית ואינך יכול לעמוד בפני הדחף או הפיתוי לבצע פעילויות מסוימות שעלולות להזיק לך או לאחרים. מדובר במה שמכונה הפרעות בקרת אימפולס ויכול לכלול התנהגויות כמו הימורים ממכרים, אכילת יתר או הוצאות יתר, תשוקה

נטילת Norprolac עם תרופות אחרות

ספר לרופא או לרוקח שלך אם אתה לוקח, נטלת לאחרונה או מתכנן ליטול תרופות אחרות.

עליך ליידע את הרופא שלך אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- נויורולפטית neuroleptics מכיוון שהם עשויים להפחית את ההשפעה על הפחתת הפרולקטין prolactin של Norprolac.
- תרופות נגד דיכאון או תרופות לטיפול בפרקינסון, מיגרנות חריפות וכו'.
- תרופות הידועות כחוסמות יעילות של אנזימים המעורבים בפירוק תרופות.
- אנטיהיסטימינים.

נורפרולאק עם אוכל, שתייה ואלכוהול

אסור לשתות אלכוהול בזמן נטילת נורפרולאק, מכיוון שההשפעות השליליות עלולות להיות מוגברות.

פוריות, הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה, או חושבת שאת יכולה להיות בהריון או מתכוונת להיכנס להריון, התייעצי עם הרופא או הרוקח שלך לפני שתשתמשי בתרופה זו. הניסיון במהלך ההריון מוגבל. אם את נכנסת להריון או רוצה להיכנס להריון בזמן נטילת נורפרולאק, ידעי את הרופא שלך. נורפרולאק גורם להפרעה בהפרשת חלב ולכן הנקה בדרך כלל אינה אפשרית. עם זאת, אין להמשיך בהנקה למרות שהנקה אפשרית מכיוון שלא ידוע אם הקוינאגוליד עובר לחלב אם.

נהיגה ושימוש במכוונות

באנשים מסוימים Norprolac, עשוי להפחית את ההיענות במהלך הימים הראשונים לטיפול, יש לקחת בחשבון במצבים שדורשים ערנות, כמו למשל לנהיגה או לביצוע עבודות דיוק. במקרים נדירים, יש אנשים שחווים שינה פתאומית מבלי להרגיש עייפות קודם לכן. אם אתה נתקל במצב זה, אסור לך לנהוג או לבצע פעילויות שעלולות לגרום לך או לאחרים להיות בסיכון לפגיעה קשה (כגון שימוש במכוונות).

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של נורפרולאק Norprolac

תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה

3. כיצד ליטול טבליות Norprolac 75 מיקרוגרם

השתמש תמיד בתרופה זו בדיוק כפי שהרופא שלך אמר לך. אם יש ספק, התייעץ עם הרופא או הרוקח שלך שוב. זכור לקחת את התרופה שלך.

מבוגרים

יש לתת Norprolac פעם ביום ורק לפני השינה, עם אוכל, בכדי למנוע תופעות לוואי שליליות כמו בחילות, הקאות וסחרחורות. המינון של נורפרולאק יהיה תלוי בהשפעתו בהפחתת רמת הפרולקטין.

מינון התחלתי

הטיפול מתחיל בדרך כלל במינון של 25 ו- 50 מיקרוגרם ליום; החל במינון של 25 מיקרוגרם / יום בשלושת הימים הראשונים וממשיך במינון של 50 מיקרוגרם / יום במשך שלוש הימים הבאים.

מינון תחזוקה

מהיום השביעי, לאחר השלב הראשוני, המינון המומלץ הוא 75 מיקרוגרם ליום. במידת הצורך, ניתן להגדיל את המינון היומי בהדרגה עד להגעה לתגובה האישית האופטימלית. מינון התחזוקה הרגיל נע בין 75 ל- 150 מיקרוגרם ליום. חלק מהמטופלים עשויים להזדקק למינונים של 300 מיקרוגרם ליום ומעלה.

שימוש בילדים ומתבגרים

הניסיון בקרב ילדים ומתבגרים מוגבלת.

שימוש בחולים קשישים
הניסיון בקרב קשישים מוגבל.

- שינויים או התגברות העיניים וההתנהגות המינית העלולים להדאיג אותך ואחרים באופן משמעותי, למשל, הגברת התשוקה המינית.
- קניות ותוצאות מופרזות ללא שליטה.
- אכילה וזליחה (אכילת כמויות גדולות של אוכל בפרק זמן קצר) או אכילה כפייתית (אכילת יותר אוכל מהרגיל ויותר מהנדרש בכדי לספק את הרעב).

דיווח על תופעות לוואי

אם אתם חווים תופעות לוואי מכל סוג, יש להתייעץ עם הרופא, הרוקח או האחיות, גם אם יתכן כי תופעות הלוואי אינן מופיעות בעלון זה. תוכלו גם לתקשר אותן ישירות דרך מערכת התרופות לפיקוח מוצרי תרופות לשימוש הומני; <https://sideeffects.health.gov.il>
<https://notificaram.es>
על ידי העברת תופעות לוואי אתם יכולים לעזור במתן מידע על בטיחות תרופה זו.

5. כיצד לאחסן טבליות Norprolac 75 מיקרוגרם

הרחק מחוץ לטווח הראייה של ילדים.
אין לאחסן מעל 25 מעלות צלזיוס.
יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני אור ולחות.
אל תוציא את הטבליות מאריזתן עד לרגע השימוש.
אין להשתמש בנורפרולק Norprolac לאחר תאריך התפוגה המצוין על הקרטון לאחר ה EXP -תאריך התפוגה הוא היום האחרון בחודש שצוין. אסור לזרוק תרופות לניקוז או לפח. השלך אריזות ותרופות שאינך זקוק להן בנקודת SIGRE בבית המרקחת. אם יש ספק, שאל את הרוקח כיצד להיפטר מהאריזה ותרופות שאינך זקוק להן.
בדרך זו תעזור בהגנה על הסביבה.

6. תכולת החבילה ומידע נוסף

הרכב הטבליות Norprolac 75 מיקרוגרם

החומר הפעיל הוא קינגוליד.
כל טבליה של 75 מיקרוגרם מכילה 75 מיקרוגרם של קינגוליד (כקווינגוליד הידרוכלוריד).
שאר המרכיבים של הטבליה הם: לקטוז מונוהידראט; סיליקה נטולת מים קולואידלית; מגנזיום סטיארט; היפרמולוזה; עמילן תירס; תאית מיקרו-קריסטלית.
אין נראה המוצר ותכולת האריזה
הלוח של 75 מיקרוגרם לבן, עגול, קצה שטוח, משולב בקוטר 7 מילימטרים.

כתובות: עגול "NORPROLAC" בצד אחד ו" 75 / כיניארי בצד השני.
NORPROLAC מגיע באריזות של 30 טבליות
3 בליסטרים אלומיניום של 10 טבליות כל אחת.
הופעות אחרות
NORPROLAC טבליות 25 מיקרוגרם ו 50 מיקרוגרם - חבילה עם 3 טבליות של 25 מיקרוגרם (ורוד בהיר) ו 3- טבליות של 50 מיקרוגרם (תכלת).

בעל הרשאת שיווק ואחראי לייצור

בעל רישום

Ferring, SAU, C / del Arquitecto Sánchez Arcas nº3, 1º

28040 מדריד ספרד

יצרן

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 קיל, גרמניה

עלון זה עודכן לאחרונה באוקטובר 2014.

מידע מפורט ומעודכן על תרופה זו זמין באתר האינטרנט של הסוכנות הספרדית לתרופות ומוצרי בריאות: <http://www.aemps.es> (AEMPS)

יבואן:

A.L.MEDI-MARKET הקדר 18, נתניה

אם אתה לוקח יותר Norprolac ממה שאתה צריך
אם השתמשת בנורפרולק יותר ממה שאתה צריך, התייעץ מייד עם הרופא, הרוקח שלך או התקשר לשירות המידע לטוקסיקולוגיה, טלפון 04-7771900 (915 620 420) עם ציון התרופה והכמות שצרכת. תסמינים שניתן לצפות במנות יתר הם בחילה, הקאות, כאבי ראש, סחרחורת, נמנום, הזיות, לחץ דם מופתת.

אם שכחת ליטול נורפרולק Norprolac

אם שכחת ליטול את נורפרולק ליום אחד, קח את התרופה כרגיל למחרת. אין ליטול מנה כפולה למחרת כדי לפצות על המנה שהוחמצה, מכיוון שהיא עלולה לגרום לתופעות לוואי לא רצויות.

אם תפסיק ליטול Norprolac

ספר לרופא שלך אם ברצונך להפסיק את הטיפול ב Norprolac. אם תפסיק ליטול, Norprolac ככל הנראה רמת הורמון הפרולקטין שלך תעלה והתסמינים שלך ככל הנראה יחזרו. עם זאת, מכיוון שהדבר מתרחש מספר ימים לפני שנעלמת נורפרולק מגופך, ההשפעה של הפסקת הטיפול תופיע רק לאחר מספר ימים.
אם יש לך שאלות נוספות לגבי השימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו כל התרופות, Norprolac עלולה לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כולם סובלים מכך.
תופעות הלוואי המפורטות להלן הן בדרך כלל קלות ומופיעות בתדירות גבוהה יותר במהלך הימים הראשונים לטיפול או כאשר מגדילים את המינון, נעלמים עם נטילה קבועה, לכן אין לשנות את המינון שנקבע ללא ידיעת הרופא שלו.

תופעות הלוואי הבאות עשויות להופיע בתרופה זו:

שכיח מאוד, עשוי להימנע ביותר מ- 1 מכל 10 אנשים

- ורטיגו
- כאב ראש
- מתלה
- הקאות
- עייפות

שכיח, עשוי להופיע אצל עד אחד מכל 10 אנשים

- ירידה זמנית בלחץ הדם כאשר מאמצים זקוף וגורמת להתעלפות
- אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- קושי בשינה
- גודש באף
- כאב בטן
- שלשול לעצירות
- חולשת שרירים

נדיר, עשוי להופיע אצל עד 1 מכל 1,000 אנשים

- נמנום
- פסיכოזה חריפה שנעלמת בעת הפסקת הטיפול בנורפרולק Norprolac

תופעות לוואי אחרות אשר התדר לא ידוע להן

- סינקופה
- חוסר יכולת להתנגד לדחף, צורך או לפיתוי לנקוט בפעולה שעלולה להיות מסוכנת לך או לאחרים, אשר עשויים לכלול:

- צורך חזק להמר, גם כאשר יש לו השלכות אישיות ומשפחתיות חמורות.